



Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina
Unidad de Posgrado
Programa de Segunda Especialización en Medicina Humana

**"Complicaciones tempranas en reducción mamaria,
con la técnica de pedículo inferior, en el Hospital
Nacional Edgardo Rebagliati Martins, 1998-2007"**

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el Título de Especialista en Cirugía Plástica

AUTOR

Percy Martín NEVADO ALBÁN

Lima, Perú

2012

RESUMEN

Objetivos: Describir las principales características clínicas, evolución perioperatoria y las complicaciones en las pacientes sometidas a reducción mamaria con la técnica de pedículo inferior, en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martíns, en el periodo de enero de 1998 a diciembre del 2007.

Material y métodos: La muestra seleccionada estuvo comprendida por 41 pacientes que fueron sometidas a reducción mamaria con la técnica de pedículo inferior. Los instrumentos empleados estuvieron conformados por una ficha de recolección de datos convenientemente elaborada para los fines de estudio.

Resultados: La media de la edad fue de 44.9+/-11.3 años. La mayoría de pacientes tenían por ocupación su casa en el 58.5%. El 48.8% eran casadas. El 56.1% tenían problemas psicológicos asociados a la hipertrofia mamaria. El 80.5% de los casos no tuvieron antecedentes patológicos. El 56.1% de los casos tuvieron un grado de hipertrofia grave. El 75.6% no presentó alguna complicación, y el 24.4% presentó una complicación. La complicación más frecuente fue la dehiscencia de herida en el 9.8%, y el hematoma en el 7.3% .Se usó dren en el 87.8% de los casos

Conclusiones: La mayoría de pacientes eran amas de casa, casadas, con problemas psicológicos, y con hipertrofia grave de la mama. La complicación temprana post operatoria más frecuente de las pacientes, fue la dehiscencia en la unión de la "T" invertida. La evolución de las complicaciones tempranas post operatorias de las pacientes, fue favorable. El manejo más frecuente de las complicaciones tempranas post operatorias, fue el autoinjerto de piel parcial de la dehiscencia de la unión de la "T" y el drenaje de hematoma.

Palabras claves: Reducción mamaria, pedículo inferior, complicaciones.