



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina

Unidad de Posgrado

Programa de Segunda Especialización en Medicina Humana

**"Grado de satisfacción en gestantes nulíparas vs.
multíparas a la analgesia epidural para el Trabajo de
parto del Hospital II Pasco. EsSalud"**

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el Título de Especialista en Anestesia, Analgesia y
Reanimación

AUTOR

Francisco Fabio BARRIENTOS ALEGRE

Lima, Perú

2012

RESUMEN

OBJETIVO: Determinar y comparar el grado de satisfacción en gestantes nulíparas y multíparas a la analgesia epidural para el trabajo de parto

MÉTODOS: Estudio prospectivo, comparativo, transversal y observacional. De tipo Encuesta comparativa.

RESULTADOS: La edad mediana de los 52 pacientes fue 28 años. El grupo de las gestantes nulíparas resultó más joven con una mediana de 25 y en el grupo de las multíparas fue mayor, siendo 30 años. Todas las pacientes gestantes encuestadas hablaban castellano. Tanto las gestantes nulíparas como multíparas fueron alfabetas. Ninguna gestante había recibido anteriormente una analgesia de parto. En el grupo de las multíparas, el 80,8% de las pacientes tuvieron recuerdo de dolor anterior y 19,2% de ellas no lo tuvieron. La calificación del dolor del parto anterior sólo en las pacientes multíparas fue dolor severo en su totalidad de gestantes. Las gestantes multíparas clasificaron al dolor del parto anterior sin analgesia epidural, porque no recibieron, como dolor regular en el 3,8% de las gestantes y como dolor severo en el 96,2%. El alivio del dolor durante el trabajo de parto, en las gestantes nulíparas fue completo y moderado en el 50%. En el grupo de las gestantes multíparas fue completo en el 76,9%, moderado en el 15,4% y un alivio total en el 7,7%. La clasificación del dolor de trabajo de parto en gestantes nulíparas con analgesia epidural fue sin dolor en el 7,7% y dolor leve es decir con un valor de 2 a 4 en la escala visual análoga en el 92,3%. El grupo de las gestantes multíparas lo clasificaron en sin dolor en el 50%, leve en 46,1% y dolor regular en el 3,8%. El dolor durante el periodo expulsivo en la gestante nulípara fue dolor leve es decir un EVA de 2 a 4 en el 92,3% y sin dolor 2 pacientes correspondiente a 7,7%. El dolor durante el periodo expulsivo en la gestante multípara fue dolor leve en el 46,2%, sin dolor en el 50% y dolor regular, es decir un EVA de 5 a 7, en 3,8%. Las gestantes nulíparas tuvieron un grado de satisfacción bueno con 69,2%, regular en 26,9% y excelente en 3,8%. Las gestantes multíparas calificaron a la analgesia de parto como excelente en el 65,4%, bueno en el 31,2% y regular en el 23,1%.

CONCLUSION: El alivio del dolor durante el trabajo de parto, en las gestantes nulíparas fue completo y moderado. En el grupo de las gestantes multíparas fue completo. La clasificación del dolor de trabajo de parto en gestantes nulíparas con analgesia epidural fue dolor leve es decir con un valor de 2 a 4 en la escala visual análoga y en el grupo de las gestantes multíparas lo clasificaron como sin dolor y leve. El dolor durante el periodo expulsivo en la gestante nulípara fue dolor leve. El dolor durante el periodo expulsivo en la gestante multípara fue dolor leve y sin dolor. Las gestantes nulíparas tuvieron un grado de satisfacción bueno. Las gestantes multíparas calificaron a la analgesia de parto como excelente.

PALABRAS CLAVES: Grado de satisfacción, gestantes, nulíparas, multíparas, analgesia epidural.