Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina
Unidad de Posgrado
Programa de Segunda Especialización en Medicina Humana

"Comparación de resultados audiométricos y anatómicos en timpanoplastías tipo I con cartílago y con fascia temporal en pacientes con otitis media crónica en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins desde marzo del 2008 a febrero del 2010"

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el Título de Especialista en Otorrinolaringología

AUTOR

Víctor Renato TORRES LAZO

ASESOR

Miguel Ángel SALAZAR LEGUA

Lima, Perú

2010

RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado "Comparación de los resultados audiométricos y anatómicos en timpanoplastías tipo I con cartílago y con fascia temporal en pacientes con otitis media crónica en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins desde Marzo del 2008 a Febrero del 2010". La investigación estuvo orientada a comparar los resultados audiométricos y anatómicos en las timpanoplastías tipo I realizadas con cartílago y con fascia temporal en pacientes con otitis media crónica para ello se realizó un estudio, descriptivo, retrospectivo, de casos.

La muestra seleccionada estuvo comprendida por 63 casos (pacientes **a** los que se les realizó timpanoplastías tipo I con cartílago y con fascia temporal por otitis media crónica) en el periodo que corresponde al estudio. Los instrumentos empleados estuvieron conformados por una ficha de recolección de datos convenientemente elaborada para los fines de estudio.

Se concluye en el estudio que: No existen diferencias estadísticamente significativas entre los resultados anatómicos del tímpano reconstruido con cartílago y con fascia temporal en la timpanoplastía tipo I. ($P>0.05$).No existen diferencias estadísticamente significativas entre los resultados audiométricos en las timpanoplastías tipo I realizadas con cartílago y con fascia temporal. ($P>0.05$).La tasa de éxito en las timpanoplastías tipo I con cartílago fue del 90.9% y las realizadas con fascia de músculo temporal fue del 84.6%

PALABRAS CLAVE: Timpanoplastías tipo I, resultados audiométricos y anatómicos, otitis media crónica.