



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina

Escuela Académico Profesional de Obstetricia

**Factores de riesgo que predisponen a endometritis
puerperal en el Instituto Nacional Materno Perinatal
periodo enero a diciembre - 2010**

TESIS

Para optar el Título Profesional de Licenciado en Obstetricia

AUTOR

Christian Pierr VELASQUEZ LUQUE

ASESOR

Emma Felicia SALAZAR SALVATIERRA

Lima, Perú

2012

RESUMEN

OBJETIVOS:

Determinar los principales factores de riesgo que predisponen al desarrollo de una endometritis puerperal en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) durante el periodo Enero - Diciembre del año 2010.

MATERIALES Y MÉTODOS:

Se realizó un estudio descriptivo, analítico casos controles, transversal, retrospectivo analizando un total de 147 historias clínicas de pacientes divididas en 63 casos (con endometritis puerperal) y 84 controles (sin endometritis puerperal). Los criterios de inclusión en el grupo de casos y controles fueron: Puérperas mediatas de parto vaginal a término con el diagnóstico de endometritis puerperal, atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) durante el periodo Enero- Diciembre del año 2010. Los criterios de exclusión fueron: Puérperas inmediatas, puérperas mediatas con diagnóstico de parto prematuro, con diagnóstico de otras infecciones en el puerperio y Puérperas de parto por cesárea. La recolección de los datos fue realizado a través de un cuestionario el cual fue dividido en tres partes: I. Factores Generales, II. Factores en Relación con el parto y III Factores en Relación con las Operaciones Obstétricas.

RESULTADOS:

Se encontró que la anemia pre parto y el desarrollo de endometritis puerperal presenta una relación de 2:1 OR: 2.42 (1.19-4.94) IC: 95%, presentando el 50.9% de los casos esta patología. En el 76.0% de los casos se realizó episiotomía, mientras que en los controles el porcentaje fue del 45.2%. Estas diferencias resultaron estadísticamente significativas ($p=0.001$), lo que refleja la asociación entre dichas variables OR: 3.8 IC: 95%. Además los factores de riesgo con mayor presencia porcentual fueron: Primiparidad (55.7%), Anemia pre parto (50.9%), Realización de Episiotomía (76%) y Los factores de riesgo con menor presencia porcentual fueron: Nivel Socioeconómico Bajo (15.6%), RPM (4.3%), Corioamnionitis (2.1%), Extracción Manual de Placenta (0%). Diabetes (0%),

CONCLUSIÓN:

La anemia pre parto y la episiotomía durante el trabajo de parto fueron los principales factores de riesgo asociados al desarrollo de endometritis puerperal.