



**Universidad Nacional Mayor de San Marcos**

**Universidad del Perú. Decana de América**

Facultad de Medicina

Unidad de Posgrado

Programa de Segunda Especialización en Medicina Humana

**"Epidemiología y morbilidad del tratamiento quirúrgico de hidatidosis intrabdominal en niños menores de 15 años tratados quirúrgicamente en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen durante el periodo 1995-2010"**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN**

Para optar el Título de Especialista en Cirugía Pediátrica

**AUTOR**

Carmen Tatyana TORRES LÓPEZ

**ASESOR**

Víctor Alejandro CASQUERO MONTES

Lima, Perú

2011

**“EPIDEMIOLOGIA Y MORBILIDAD DEL TRATAMIENTO QUIRURGICO  
DE HIDATIDOSIS INTRABDOMINAL EN NIÑOS MENORES DE 15 AÑOS  
TRATADOS QUIRURGICAMENTE EN EL HOSPITAL NACIONAL  
GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN DURANTE EL PERIODO 1995-2010.”**

**I.- RESUMEN:**

**OBJETIVOS:** Determinar las características epidemiológicas y morbilidad de la hidatidosis intraabdominal en pacientes pediátricos atendidos en el servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.

**MATERIAL Y METODOS:** Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal y observacional entre todos los pacientes pos operados con diagnostico de hidatidosis intrahepatica desde enero de 1995 a diciembre del 2010(n=37).

**RESULTADOS:** La prevalencia observada en los niños mayores de cinco años es 81% a predominio del sexo masculino con 67.6%.Procedentes de la ciudad de Lima en 54%, de Lima provincia 13,5% y Cerro de Pasco 13,5%, además de tener antecedente de viaje a zonas endémicas y crianza de perros y ganado 62,2% .El 59,4% de los pacientes no presento complicaciones. El órgano más afectado fue el hígado en 94.6%, en más de dos segmentos (70,3%). El 43.2%. de los pacientes tenían antecedente de tratamiento, de quiste hidatídico pulmonar.

**CONCLUSIÓN:** La prevalencia de hidatidosis intraabdominal es más alta en la población pediátrica mayor de cinco años de sexo masculino y con antecedentes de viaje a zonas endémicas para hidatidosis y crianza de perros. El órgano intraabdominal afectado con mayor frecuencia es el hígado en el lóbulo derecho, en más de dos segmentos.

**PALABRAS CLAVE:** QUISTE HIDATIDICO-ABDOMEN-MORBIMORTALIDAD-NIÑOS