



Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América
Facultad de Medicina
Escuela Académico Profesional de Medicina Humana

**Incidencia de cáncer vesicular en el Hospital Nacional
Dos de Mayo, 2006 - 2011**

TESIS

Para optar el Título Profesional de Médico Cirujano

AUTOR

Alvaro Javier ESTEBAN BLAS

ASESORES

María Angélica VALCÁRCEL SALDAÑA

Gustavo Adolfo CERRILLO SÁNCHEZ

Lima, Perú

2012

RESUMEN

Objetivos: Determinar la incidencia de cáncer vesicular en el Hospital Nacional “Dos de Mayo” tanto en las cirugías de emergencia y electivas por vía convencional o laparoscópica en el periodo comprendido del 2006 al 2011.

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal. Se revisaron 51 historias clínicas de los pacientes con diagnóstico anatomopatológico de cáncer vesicular; operados en el periodo que corresponde al estudio.

Resultados: La incidencia de cáncer vesicular tanto en las cirugías de emergencia y electivas por vía convencional o laparoscópica fue de 0,9%. El 86.3% de los pacientes fueron operados de manera electiva. El 82.4% fueron pacientes del sexo femenino. La media de la edad del total de pacientes fue de 64.5 ± 14 años, siendo la mínima edad de 38 años y la máxima de 94 años. Hubo una mayor frecuencia de adenocarcinoma medianamente diferenciado en el 76.5%. El 52.9% de los pacientes presentó baja de peso. En el 80.4% de los casos se identificaron cálculos en la ecografía. Se encontró cálculos intraoperatorios en el 80.4%. Hubo masa en el intraoperatorio en el 56.9%. Se sospechó de cáncer en el intraoperatorio en el 58.8%. El 70.6% de los casos se operaron por vía convencional. En relación al estadiaje el 45.1% presentó infiltración a la pared vesicular. El 45.1% de los casos presentó T4. El 80.4% de los casos no tuvo infiltración en ganglios. El 66.7% de los casos no presentó metástasis. La ubicación más frecuente fue el fondo vesicular. Se realizó disección ganglionar al 13.7% de los casos y segmentectomía hepática al 3.9% de los casos. El tumor fue resecable en el 92.16% de los casos.

Conclusiones: La incidencia de cáncer vesicular en el Hospital Nacional 2 de Mayo se encuentra dentro de los límites reportados en la literatura internacional y bajo en relación a estudios nacionales anteriores. El cáncer vesicular es más frecuente en pacientes del sexo femenino que presentaron baja de peso, operadas de manera electiva o por vía convencional; con una alta frecuencia de cálculos, masa, y sospecha de cáncer en el intraoperatorio; cuyas edades fluctuaban entre los 51 a 77 años. El tipo de mayor incidencia fue el adenocarcinoma medianamente diferenciado.

Palabras clave: Cáncer de vesícula biliar, incidencia, colecistectomía.