



# **Universidad Nacional Mayor de San Marcos**

**Universidad del Perú. Decana de América**

**Facultad de Medicina**

**Escuela Académico Profesional de Obstetricia**

## **Nivel de conocimientos y prácticas acerca del anticonceptivo oral de emergencia (AOE) en los internos rotantes en el área de Gineco-Obstetricia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, enero- febrero 2012**

### **TESIS**

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia

### **AUTORES**

Sandra MAMANI MENDOZA

Dersy Liz MONTALVÁN ROMÁN

### **ASESOR**

Victoria Isabel RIVAS GÓMEZ

Lima, Perú

2012

## RESUMEN

### NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS ACERCA DEL ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA (AOE) EN LOS INTERNOS ROTANTES EN EL AREA DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION ENERO-FEBRERO 2012

**Objetivos:** Determinar el nivel de conocimientos y prácticas acerca el anticonceptivo oral de emergencia en los internos rotantes en el área de Gineco-Obstetricia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. **Material y método:** El presente estudio es cuantitativo; descriptivo de corte transversal. La población estuvo constituida por todos los internos rotantes del área Gineco-Obstetricia en los meses de enero y febrero 2012, siendo el total en este periodo 35 internos. El instrumento que se utilizó fue un formulario tipo cuestionario. **Resultados:** En relación al nivel de conocimiento el anticonceptivo oral de emergencia de 35 (100%) de los internos, 10 (28%) tienen un conocimiento alto; 17 (49%) medio y 8 (23%) bajo. Respecto a las prácticas sobre el anticonceptivo oral de emergencia; de 35 (100%) internos, 14 (40%) manifiesta haber tomado alguna vez el anticonceptivo oral de emergencia. De los cuales 10 (71.4%) realiza una práctica inadecuada y 4 (28.6%) realiza un practica adecuada. **Conclusiones:** Los internos rotantes del área de Gineco-Obstetricia del Hospital Daniel Alcides Carrión, en su mayoría poseen un nivel de conocimiento medio (49%) sobre el anticonceptivo oral de emergencia, presentando mayor deficiencia en la característica de mecanismo de acción (37%). En cuanto a las prácticas, del 40% de los internos que utilizaron el anticonceptivo oral de emergencia, el 71% presentaron prácticas incorrectas, teniendo mayor dificultad en el manejo de los efectos secundarios (93%).

**Palabras claves:** Conocimiento y prácticas, anticoncepción oral de emergencia, internos del área de la salud, Gineco-obstetricia.