



Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina
Unidad de Posgrado
Programa de Segunda Especialización en Enfermería

**"Calidad de vida de los pacientes con infarto agudo de
miocardio tratados con fibrinólisis en la Unidad de
Shock Trauma del HNERM, 2006"**

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el Título de Especialista en Enfermería en Emergencias
y Desastres

AUTOR

Jeysi CALLAS CASTRO

Lima, Perú

2010

RESUMEN

Objetivo. Determinar la calidad de vida de los pacientes con IMA que recibieron terapia fibrinolítica en la unidad de shock trauma del hospital Edgardo Rebagliatti Martins. **Material y métodos.** Estudio descriptivo transversal en pacientes de ambos sexos menores de 75 años de edad dados de alta con el diagnóstico de IAM que fueron tratados con terapia fibrinolítica en la Unidad de Shock Trauma, en un periodo de 1 a 3 meses consecutivos durante 2006. Se utilizó un cuestionario de calidad de vida, específico para pacientes post IMA. Se analizaron los datos con programa estadístico SPSS v.12. **Resultados.** Se estudiaron un total de 12 pacientes, de los cuales 8 (66.67%) eran varones y 4 (33.3%) mujeres. 6 (50%) se encuentran entre las edades comprendidas de 50 a 64 años, 4 (33.3%) tienen entre 34 y 70 años y 2 (16.7%) son mayores de 70 años. La edad promedio de la muestra en general fue de 66.3+/- 11.7. La calidad de vida en general fue buena en 9 (75%) de los casos, regular en 2 (17%) y mala en 1 (8%) de los casos entrevistados. Los indicadores biopsicosociales más afectados fueron el tomar muchas medicinas, no poder levantar objetos pesados, caminar largas distancias, disminución en el rendimiento del trabajo, sentir temor a morir, disminución de la actividad sexual, que cambie su hábito alimentario y el poder continuarlo. **Conclusiones.** En pacientes existe al mes y a los tres meses de sufrir un IMA, una mayor afectación en ciertos componentes de la calidad de vida.

Palabras Claves: Calidad de Vida, Infarto Agudo de miocardio y Terapia Fibrinolítica.

SUMMARY

I target. To determine the quality of life of the patients with IMA that received therapy fibrinolítica in the unit of shock trauma of the hospital Edgardo Rebagliatti Martins. **Material and methods.** Descriptive transverse study in patients of both sexes 75-year-old minors of age given of discharge with IAM's diagnosis that they were treated by therapy fibrinolítica in the Unit of Shock Trauma, in a period from 1 to 3 consecutive months during 2006. A quality questionnaire of life was in use, specific for patients post IMA. The information was analyzed by statistical program SPSS v.12. **Results.** There were studied a total of 12 patients, of which 8 (66.67 %) was males and 4 (33.3 %) women. 6 (50 %) is between the included ages from 50 to 64 years, 4 (33.3 %) has between 34 and 70 years and 2 (16.7 %) is major of 70 years. The average age of the sample in general was of 66.3 +/-11.7. The quality of life in general was good at 9 (75 %) of the cases, to regulate in 2 (17 %) and bad in 1 (8 %) of the interviewed cases. The indicators biopsicosociales more affected were to take many medicines, not to be able to raise heavy objects, travel long distances, decrease in the performance of the work, feel dread of dying, decrease of the sexual activity, which changes his food habit and to be able to continue it. **Conclusions.** In patients it exists a month and to three months of suffering an IMA, a major affectation in certain components of the quality of life.

Key words: Vida's Quality, Sharp Heart attack of myocardium and Therapy Fibrinolítica.