

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

E.A.P DE MEDICINA HUMANA

Parto vaginal en cesareada anterior una vez:

TESIS para obtener el título de Médico Cirujano

AUTORA

Pocco Hinostroza Diana Janneth

ASESOR Erasmo Huertas Tacchino

Lima – Perú 2010

..	1
Agradecimiento .	3
Resumen .	5
Texto completo ..	7

Dedicatoria A mis padres Emma y Addón a quienes amo profundamente

Parto vaginal en cesareada anterior una vez:

Agradecimiento

Al Dr Erasmo Huertas por la asesoría y por enseñarme el gusto por la investigación, al Dr Aníbal Oscanoa por las correcciones hechas durante la elaboración de la tesis, al Dr Homero Mejia , director de la oficina de estadística y a Josseph, encargado del personal de archivos, por la eficiencia en proveer las historias clínicas.

Parto vaginal en cesareada anterior una vez:

Resumen

Objetivos: La investigación estuvo orientada a determinar los resultados materno perinatales de las pacientes con antecedente de Cesárea anterior una vez, sometidas a trabajo de parto comparadas con las sometidas a cesárea electiva iterativa en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Determinar las complicaciones obstétricas.

Muestra: La muestra seleccionada estuvo comprendida por 266 gestantes con antecedente de cesárea anterior una vez sin contraindicación en la gestación actual para parto vaginal.

Instrumentos: Los instrumentos empleados estuvieron conformados por una ficha de recolección de datos convenientemente elaborada para los fines de estudio, se analizó la fuerza de asociación con RR, IC 95%.

Tipo de Estudio: Observacional.

Diseño de investigación: Cohortes retrospectivo.

Resultado: No se encontró diferencia significativa en las complicaciones obstétricas cuando se comparó el grupo de gestantes sometidas a parto vaginal con el grupo de las gestantes sometidas a cesárea electiva. No se encontró complicaciones en recién nacidos, según las variables establecidas. La tasa de éxito de parto vaginal en la gestante con cesárea anterior una vez fue de 65.4% en el INMP. La mayoría de gestantes que presentaron trabajo de parto fallido tuvieron niños de mayor peso al nacer. La mayor indicación de cesárea electiva fue PIN menor a 2 años, seguido de distocia funicular y luego tener como antecedente ser cesareada anterior.

Parto vaginal en cesareada anterior una vez:

Conclusiones: No hay asociación estadística entre los grupos de estudio con respecto a las complicaciones materno perinatales.

Texto completo

Consultar texto completo en formato PDF en la dirección:

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2010/pocco_hd/pdf/pocco_hd.pdf