



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina

Escuela Profesional de Obstetricia

Características clínicas, gineco-obstétricas y de vida sexual relacionadas al síndrome de flujo vaginal en gestantes atendidas en el centro de salud Carlos Cueto Fernandini, enero – junio 2017

TESIS

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia

AUTOR

Lilian SALINAS TERRONES

ASESOR

Jenny Elenisse ZAVALETA LUJÁN

Lima, Perú

2018



Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

Referencia bibliográfica

Salinas L. Características clínicas, gineco-obstétricas y de vida sexual relacionadas al síndrome de flujo vaginal en gestantes atendidas en el centro de salud Carlos Cueto Fernandini, enero – junio 2017 [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Escuela Profesional de Obstetricia; 2018.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América
Facultad de Medicina

Escuela Profesional de Obstetricia

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"



Nº142

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO (A) EN OBSTETRICIA

El jurado designado para evaluar la Sustentación de Tesis, de acuerdo a las "Normas para la Elaboración de Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado (a) en Obstetricia en las Escuelas Profesionales de la Facultad de Medicina", de:

BACHILLER: SALINAS TERRONES LILIAN

Cuyo título es: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, GÍNECO-OBSTÉTRICAS Y DE VIDA SEXUAL RELACIONADAS AL SÍNDROME DE FLUJO VAGINAL EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CARLOS CUETO FERNANDINI, ENERO-JUNIO 2017. Reunidos en la fecha, después de la sustentación y resolución de preguntas por el Tesista, acordó el siguiente calificativo:

Bueno
[Signature]
MG. OBST. CLARA MARGARITA DÍAZ TINOCO
C.O.P. 3303
PRESIDENTE

Dicíseis 16
[Signature]
MG. OBST. NELLY MARÍA ESPERANZA BARRANTES CRUZ
C.O.P. 1320
MIEMBRO

Edita Rumiñalda Cuya Candela
[Signature]
LIC. OBST. EDITA RUMIÑALDA CUYA CANDELA
C.O.P. 1262
MIEMBRO

J. Larrea
[Signature]
LIC. OBST. JENNY ELENISSE ZÁVALETA LUJAN
C.O.P. 7646
ASESOR (A)

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE MEDICINA
[Signature]
Mg. CLARA DÍAZ TINOCO
DIRECTORA
FACULTAD DE MEDICINA

Lima, 25 de enero del 2018

RESUMEN

OBJETIVO: Determinar la relación entre el síndrome de flujo vaginal durante el embarazo y las características clínicas, gineco-obstétricas y de vida sexual en gestantes atendidas en el centro de salud Carlos Cueto Fernandini periodo enero - junio 2017.

METODOLOGÍA: Estudio epidemiológico observacional analítico transversal, retrospectivo, de casos y controles. Se evaluaron 100 historias clínicas de gestantes atendidas en el centro de salud Carlos Cueto Fernandini que cumplieron los criterios de selección, cuya muestra estuvo conformada por 50 usuarias con síndrome de flujo vaginal y 50 usuarias sin síndrome de flujo vaginal. Para el análisis descriptivo de los datos, se tuvieron en cuenta medidas de tendencia central y medidas de dispersión; así como frecuencias absolutas (valores numéricos) y relativas (porcentajes). La asociación entre las variables fue mediante la prueba estadística Chi cuadrada (χ^2), la cual se consideró significativa cuando tuvo un valor $p<0.05$ y para la fuerza de asociación, se aplicó la razón de productos cruzados Odds Ratio (OR) con el intervalo de confianza al 95 %.

RESULTADOS: La edad promedio de las gestantes del grupo control fue de 26 años y del grupo caso fue 24 años. Las variables que se asociaron como factores de riesgo fueron presentar Infección del tracto urinario en el embarazo (OR=2.67; IC 95%:1.00 – 7.31), presentar inflamación moderada en el cuello del útero (OR=4.04; IC 95%:1.11 – 18.21), el inicio de relaciones sexuales antes de los 16 años (OR=3.24; IC 95%:0.86 – 14.92), tener más de dos parejas sexuales (OR=9.2; IC 95%:13.19 – 28.57), tener antecedente de ITS (OR=6.31; IC 95%:2.41 – 16.92) y haber sido víctima de violencia intrafamiliar (OR=4.95; IC 95%:1.19 – 28.84). Mientras que el tener una sola pareja sexual (OR=0.25; IC 95%:0.09 – 0.69), el no presentar ningún tipo de comorbilidad en la gestación (OR=0.44; IC 95%: 0.18 – 0.82) y el uso del preservativo se asociaron como factores protectores (OR=0.11; IC 95%:0.04 – 0.34).

CONCLUSIONES: las características clínicas, las características gineco-obstétricas y las características de vida sexual de la gestante asociadas con el síndrome de flujo vaginal fueron: presentar infección urinaria durante el embarazo, presentar inflamación moderada del cérvix, iniciar las relaciones sexuales antes de los 16 años, tener más de dos parejas sexuales, tener antecedente de ITS y haber sido víctima de violencia familiar.

PALABRAS CLAVES: características clínicas, vida sexual de la gestante, síndrome de flujo vaginal.

ABSTRACT

OBJECTIVE: To determine the relationship between vaginal discharge syndrome during pregnancy and the clinical, gynecological-obstetric and sexual life characteristics in pregnant women treated at the Carlos Cueto Fernandini health center period January - June 2017.

METHODOLOGY: Cross-sectional, retrospective, analytical observational epidemiological study of cases and controls. We evaluated 100 clinical histories of pregnant women attended at the Carlos Cueto Fernandini health center who met the selection criteria, whose sample consisted of 50 users with vaginal discharge syndrome and 50 users without vaginal discharge syndrome. Measures of central tendency and measures of dispersion were taken into account for the descriptive analysis of the data; as well as absolute frequencies (numerical values) and relative frequencies (percentages). The association between the variables was through the Chi square statistical test (χ^2), which was considered significant when it had a value $p <0.05$ and for the strength of association, the ratio of cross products Odds Ratio (OR) was applied with the interval 95% confidence

RESULTS: The average age of the pregnant women in the control group was 26 years and the case group was 24 years. The variables that were associated as risk factors were presenting urinary tract infection in pregnancy (OR = 2.67, 95% CI: 1.00 - 7.31), presenting moderate inflammation in the cervix (OR = 4.04, 95% CI: 1.11 - 18.21), the beginning of sexual intercourse before the age of 16 (OR = 3.24, 95% CI: 0.86 - 14.92), having more than two sexual partners (OR = 9.2, 95% CI: 13.19 - 28.57), having a history of STIs (OR = 6.31, 95% CI: 2.41 - 16.92) and having been a victim of intrafamily violence (OR = 4.95, 95% CI: 1.19 - 28.84). While having only one sexual partner (OR = 0.25, 95% CI: 0.09 - 0.69), not presenting any type of comorbidity in pregnancy (OR = 0.44, 95% CI: 0.18 - 0.82) and the use of condoms they were associated as protective factors (OR = 0.11, 95% CI: 0.04 - 0.34).

CONCLUSIONS: the clinical characteristics, the gynecological-obstetric characteristics and the sexual life characteristics of the pregnant woman associated with the vaginal discharge syndrome were: presenting urinary infection during pregnancy, presenting moderate inflammation of the cervix, initiating sexual intercourse before the 16th years, having more than two sexual partners, having a history of STIs and having been a victim of family violence.

KEY WORDS: clinical characteristics, sexual life of the pregnant woman, vaginal discharge síndrome.