



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina

Escuela Profesional de Obstetricia

**Factores de riesgo obstétrico asociados a la valoración
del bienestar en el recién nacido a término 2017**

TESIS

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia

AUTOR

Dolly Janira TRUJILLO FLORES

ASESOR

Milena LÓPEZ SÁNCHEZ

Lima, Perú

2018



Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

Referencia bibliográfica

Trujillo D. Factores de riesgo obstétrico asociados a la valoración del bienestar en el recién nacido a término 2017 [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Escuela Profesional de Obstetricia; 2018.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos
 Universidad del Perú. Decana de América
 Facultad de Medicina



Escuela Profesional de Obstetricia
 "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
 "Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

231

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

**ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TITULO
 PROFESIONAL DE LICENCIADO (A) EN OBSTETRICIA**

El jurado designado para evaluar la Sustentación de Tesis, de acuerdo a las "Normas para la Elaboración de Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado (a) en Obstetricia en las Escuelas Profesionales de la Facultad de Medicina", de:

BACHILLER: TRUJILLO FLORES DOLLY JANIRA

Cuyo título es: **FACTORES DE RIESGO OBSTÉTRICO ASOCIADOS A LA VALORACIÓN DEL BIENESTAR EN EL RECIÉN NACIDO A TÉRMINO 2017.** Reunidos en la fecha, después de la sustentación y resolución de preguntas por el Tesista, acordó el siguiente calificativo:

Muy Bueno *Dieciocho* *18*

Edita R. Cuyá
 LIC. EDITA R. CUYA CANDELA
 C.O.P. 261
 PRESIDENTE

Marta Luque Suma
 MG. MARTA LUQUE SUMA
 C.O.P. 2893
 MIEMBRO

Susana Aurelia Garcia Parra
 LIC. SUSANA AURELIA GARCIA PARRA
 C.O.P. 2273
 MIEMBRO

Milena Lopez Sanchez
 DRA. MILENA LOPEZ SANCHEZ
 C.O.P.
 ASESOR (A)

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
 FACULTAD DE MEDICINA
Clara Diaz Durcco
 M.C. CLARA DIAZ DURCCO
 MIEMBRO

Lima, 27 de febrero del 2018

RESUMEN

Objetivos: Establecer los factores de riesgo obstétrico asociados a la valoración del bienestar en el recién nacido a término 2017.

Metodología: Estudio observacional, analítico, transversal, retrospectivo de tipo caso – control. Participaron 274 recién nacidos, los cuales fueron atendidos en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el periodo Enero – Septiembre del año 2017. Se dividieron en dos grupos: 137 pertenecen al grupo caso y 137 al grupo control. Se trabajó con variables cualitativas y el análisis de datos se empleó estadística descriptiva para variables uni, bivariantes y multivariadas. Igualmente se empleará el odds ratio (OR) para determinar la prevalencia de los factores de riesgo. El paquete estadístico seleccionado es el SPSS versión 25 y se trabajará con un nivel de significación de $P \leq 0,05$.

Resultados: Los factores de riesgo obstétrico que se asocian a un bienestar inadecuado en el recién nacido es la preeclampsia $P < 0.05$ (OR=2.07), diabetes $P < 0.05$ (OR=6.22), controles prenatales insuficientes $P < 0.05$ (OR=2.15), presentar como tipo de parto la cesárea $P < 0.05$ (OR=3.77), presentar rotura prematura de membranas $P < 0.05$ (OR= 1.89), el grado de instrucción $P < 0.05$ y el estado civil de la gestante $P < 0.05$.

Conclusión: Se encontró asociación significativa con los factores de riesgo maternos: preeclampsia, diabetes, controles prenatales. En cuanto a los factores de riesgo en el parto se encontró que el tipo de parto, la ruptura prematura de membranas y finalmente los factores de riesgo sociodemográfico con más significancia fueron el grado de instrucción y el estado civil.

Palabras clave: Factores de riesgo obstétrico, bienestar del recién nacido a término.

ABSTRACT

Objectives: To establish the obstetric risk factors associated with the assessment of well-being in the newborn at term 2017.

Methodology: Observational, analytical, cross-sectional, retrospective case-control study. 274 newborns participated, which were treated at the National Hospital Arzobispo Loayza in the period January - September 2017. They were divided into two groups: 137 belong to the case group and 137 belong to the control group. We worked with qualitative variables and the data analysis was used descriptive statistics for univariate, bivariate and multivariate variables. The odds ratio (OR) will also be used to determine the prevalence of risk factors. The selected statistical package is the SPSS version 25 and will work with a significance level of $p \leq 0.05$.

Results: Obstetric risk factors associated with inadequate well-being in the newborn are preeclampsia $P < 0.05$ (OR = 2.07), diabetes $P < 0.05$ (OR = 6.22), insufficient prenatal controls $P < 0.05$ (OR = 2.15), present as a type of delivery the cesarean section $P < 0.05$ (OR = 3.77), present premature rupture of membranes $P < 0.05$ (OR = 1.89), the degree of instruction $P < 0.05$ and the marital status of the pregnant woman $P < 0.05$.

Conclusion: Significant association with maternal risk factors was found: preeclampsia, diabetes, prenatal controls. Regarding the risk factors in childbirth, it was found that the type of delivery, the premature rupture of membranes, and finally the sociodemographic risk factors with the most significance were the level of education and marital status.

Key words: Obstetric risk factors, newborn wellbeing at term.