

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE MEDICINA

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

**Función sexual y características sociodemográficas de
mujeres post mastectomía que acuden al Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 2017**

TESIS

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia

AUTOR

Sandra del Pilar CHAMAYA RIVERA

ASESOR

Clara Hilda ROJAS ESPINOZA
Giovanna Alicia GALARZA TORRES

Lima - Perú

2018

RESUMEN

OBJETIVO: Evaluar la función sexual y las características sociodemográficas de mujeres post mastectomía que acuden al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 2017.

METODOLOGÍA: Es un estudio observacional, descriptivo, transversal. La muestra estuvo formada por 188 mujeres post mastectomía atendidas en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásica a quienes se les aplicó el Índice de Función Sexual Femenina (IFSF) de Rosen para conocer si existe riesgo de presentar disfunción sexual.

RESULTADOS: La edad promedio de las participantes se ubicó en el rango de 40 a 49 años, con un promedio de 48,27 años ($\pm 7,62$ años); más de la mitad de las participantes eran casadas (53,19%). El 50,19% poseía nivel de educación superior (técnica o universitaria), en su mayoría eran amas de casa (71,81%); el 48,94% de encuestadas nació en la zona norte o centro del país (sin incluir Lima Metropolitana o Callao) mientras que el 67,55% reside actualmente en Lima Metropolitana o Callao. Finalmente el 69,15% presentó disfunción sexual.

CONCLUSIÓN: Las mujeres post mastectomizadas presentan un alto riesgo de presentar una disfunción sexual, tomando como referencia valores menores, o iguales a 26,55 para el riesgo de disfunción sexual; siendo el deseo el dominio más afectado, y la satisfacción el menos afectado.

PALABRAS CLAVES: Función sexual, características sociodemográficas, mastectomía.

ABSTRACT

OBJECTIVE: To evaluate the sexual function and sociodemographic characteristics of post-mastectomy women attending the National Institute of Neoplastic Diseases 2017.

METHODOLOGY:

It is an observational, descriptive, cross-sectional study. The sample consisted of 188 post-mastectomy women treated at the National Institute of Neoplastic Diseases to whom the Rosen Feminine Sexual Function Index (IFSF) was applied to determine if there is a risk of sexual dysfunction.

RESULTS: The average age of the participants was in the range of 40 to 49 years, with an average of 48.27 years (\pm 7.62 years); more than half of the participants were married (53.19%).

50.19% had a higher education level (technical or university), most of them were housewives (71.81%); 48.94% of respondents were born in the north or center of the country (not including Metropolitan Lima or Callao) while 67.55% currently reside in Metropolitan Lima or Callao. Finally, 69.15% presented sexual dysfunction

CONCLUSION: Post-mastectomized women have a high risk of presenting a sexual dysfunction, taking as a reference values lower or equal to 26.55 for the risk of sexual dysfunction; desire being the most affected domain, this being the one that reaches the least frequency.

KEYWORDS: Sexual function, sociodemographic characteristics, mastectomy.