

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

**Factores asociados a las gestaciones recurrentes en
adolescentes de 12 a 17 años. Centro de Salud “El
Progreso” 2018**

TESIS

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia

AUTOR

Verónica Mercedes SUÁREZ BALDEÓN

ASESOR

Mirian Teresa SOLÍS ROJAS

Lima - Perú

2018

I. RESUMEN

OBJETIVO: Establecer los factores asociados a las gestaciones recurrentes en adolescentes de 12 a 17 años del Centro de Salud “El Progreso” 2018.

METODOLOGÍA: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y de corte transversal; participaron 74 gestantes adolescentes de 12 a 17 años con embarazo recurrente atendidas en el Centro de Salud “El Progreso” de Carabayllo durante enero y febrero del 2018. El análisis descriptivo se realizó mediante frecuencias absolutas y relativas.

RESULTADOS: Las principales características generales son edad materna de 17 años (56,8%) y ocupación ama de casa (79,7%). Factores personales: estado civil conviviente (86,5%), primera relación sexual antes de los 15 años (70,3%), uso de métodos anticonceptivos (81,1%), anterior embarazo no planificado (85,1%). Factores familiares: tener padres separados (68,9%), no confianza con la familia (70,3%), familiar directo con embarazo en su adolescencia (82,4%), edad de la pareja entre 19 a 25 años (63,5%), padres con primaria completa (43,2%). Factores socio-económicos fueron: violencia sexual (18,9%), anterior embarazo de la misma pareja (64,9%), cuidado de sus hijos por ella misma (83,8%), no percibir el sueldo mínimo del país (82,4%), dependencia económica (93,2%).

CONCLUSIONES: Los factores asociados a las gestaciones recurrentes en adolescentes de 12 a 17 años del Centro de Salud “El Progreso” fueron; personales: ser conviviente, inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años, anterior embarazo no planificado, primer embarazo menor a 15 años, ser procedente de Lima; familiares: padres separados, familiar con embarazo adolescente, edad de pareja mayor de 19 años, pareja con secundaria incompleta, padres con primaria completa; socio-económicos: violencia psicológica, mismo progenitor para los embarazos, cuidado de sus hijos por la misma adolescente, sueldo menor al mínimo y dependencia económica.

PALABRAS CLAVES: EMBARAZO ADOLESCENTE, GESTACIONES RECURRENTES, ADOLESCENTES.

II. ABSTRACT

OBJECTIVE: Establish the factors associated with recurrent pregnancies in adolescents aged 12 to 17 years of the Health Center "El Progreso" 2018.

METHODOLOGY: Observational, descriptive, retrospective and cross-sectional study; 74 pregnant adolescents from 12 to 17 years of age with recurrent pregnancy attended at the Health Center "El Progreso" of Carabayllo during January and February of 2018 participated. The descriptive analysis was carried out using absolute and relative frequencies.

RESULTS: The main general characteristics are maternal age of 17 years (56.8%) and housewife occupation (79.7%). Personal factors: cohabiting civil status (86.5%), first sexual intercourse before age 15 (70.3%), use of contraceptive methods (81.1%), previous unplanned pregnancy (85.1%). Family factors: having separated parents (68.9%), not trusting with the family (70.3%), direct family member with teenage pregnancy (82.4%), age of the couple between 19 and 25 years old (63 , 5%), parents with complete primary education (43.2%). Socio-economic factors were: sexual violence (18.9%), previous pregnancy of the same couple (64.9%), taking care of their children by themselves (83.8%), not receiving the minimum wage of the country (82.4%), economic dependence (93.2%).

CONCLUSIONS: The factors associated with the recurrent gestations in adolescents aged 12 to 17 years of the Health Center "El Progreso" were; personal: being a partner, beginning of sexual relations before the age of 15, previous unplanned pregnancy, first pregnancy less than 15 years old, being from Lima; relatives: separated parents, family member with teenage pregnancy, age of couple older than 19 years old, couple with incomplete secondary school, parents with complete primary school; socio-economic: psychological violence, same parent for the pregnancies, care of their children by the same adolescent, salary less than the minimum and economic dependence.

KEYWORDS: TEEN PREGNANCY, RECURRING GESTATIONS, ADOLESCENTS.