

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE MEDICINA
UNIDAD DE POSGRADO
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA

**Nivel de ansiedad que experimenta el paciente en
tratamiento de hemodiálisis en el Centro de Diálisis
Nuestra Señora del Carmen Cañete 2017**

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para optar el Título de Especialista en Enfermería en Nefrología

AUTOR

Deisy Soledad SOLARI ALMEYDA

ASESOR

Silas Hildeliza ALVARADO RIVADENEYRA

Lima - Perú

2018

RESUMEN

AUTOR: DEISY SOLEDAD SOLARI ALMEYDA

ASESOR: SILAS HILDELIZA ALVARADO RIVADENEYRA

El **objetivo** fue determinar el nivel de ansiedad que experimenta el paciente en el tratamiento de Hemodiálisis en el Centro de Diálisis “Nuestra Señora Del Carmen” - Cañete 2017. **Material y Método:** El estudio fue nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal; la población estuvo conformada por 30, la técnica fue la entrevista y el instrumento: la escala de Hamilton. **Resultados.** Del 100% (30), 33%(10) tienen ansiedad leve, 40% (12) ausente, 17% (5) moderada y 10% (3) grave; en la dimensión psíquica 50% (15) leve, 40% (12) ausente, 7% (2) moderada y 3% (1) grave; y en la dimensión somática 47% (14) es leve, 30% (9) ausente, 17% (5) moderada y 6% (2) grave. En la dimensión psíquica el ítems con ansiedad leve 50% (15) está referido a tensión y 47% (14) insomnio; y lo moderado 6% (2) insomnio; en la dimensión somático la ansiedad leve 50% (15) está dada por síntomas somáticos sensoriales, y 30% (9) por síntomas del sistema nervioso autónomo; lo ausente 70% (21) por síntomas genitourinarios y 67% (20) síntomas del sistema nervioso autónomo; lo moderado 10% (3) por síntomas respiratorios y 3% (1) por síntomas somáticos musculares. **Conclusiones.** La mayoría tiene ansiedad leve y ausente en la dimensión psíquica referida a la tensión, e insomnio; seguido por un menor porcentaje significativo de moderada a grave referido a insomnio; en la dimensión somática la mayoría es de leve a ausente por síntomas somático sensorial, del sistema nervioso autónomo, y síntomas genitourinarios, y la moderada a grave por síntomas respiratorios y síntomas somáticos musculares.

PALABRAS CLAVES. Nivel de Ansiedad, Cuidados de Enfermería, Dimensión Psíquica, Dimensión Somática

SUMMARY

AUTHOR: DEISY SOLEDAD SOLARI ALMEYDA

ADVISOR: SILAS HILDELIZA ALVARADO RIVADENEYRA

The objective was to determine the level of anxiety experienced by the patient in the Hemodialysis treatment at the "Nuestra Señora Del Carmen" Dialysis Center - Cañete 2017. Material and Method: The study was an application level, quantitative type, descriptive method of cross section ; The population consisted of 30, the technique was the interview and the instrument: the Hamilton scale. Results Of 100% (30), 33% (10) have mild anxiety, 40% (12) absent, 17% (5) moderate, and 10% (3) severe; in the psychic dimension 50% (15) mild, 40% (12) absent, 7% (2) moderate and 3% (1) serious; and in the somatic dimension 47% (14) is mild, 30% (9) absent, 17% (5) moderate and 6% (2) serious. In the psychic dimension, the items with mild anxiety 50% (15) are referred to tension and 47% (14) insomnia; and moderate 6% (2) insomnia; in the somatic dimension mild anxiety 50% (15) is given by sensory somatic symptoms, and 30% (9) by symptoms of the autonomic nervous system; the absent 70% (21) due to genitourinary symptoms and 67% (20) symptoms of the autonomic nervous system; moderate 10% (3) due to respiratory symptoms and 3% (1) due to muscular somatic symptoms. Conclusions Most have mild and absent anxiety in the psychic dimension referred to tension, and insomnia; followed by a lower significant percentage of moderate to severe referred to insomnia; in the somatic dimension the majority is mild to absent due to somatic sensory symptoms, autonomic nervous system, and genitourinary symptoms, and moderate to severe due to respiratory symptoms and somatic muscular symptoms.

KEYWORDS. Level of Anxiety, Nursing Care, Psychic Dimension, Somatic Dimension