



**Universidad Nacional Mayor de San Marcos**

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina

Escuela Profesional de Obstetricia

**Factores que influyen en la discontinuidad para la  
toma de Papanicolaou en mujeres atendidas en el  
Centro de Salud Leonor Saavedra, setiembre-octubre  
2017**

**TESIS**

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia

**AUTOR**

Fiorela Esther BRAVO LURITA

**ASESOR**

Emma Felicia SALAZAR SALVATIERRA

Lima, Perú

2018



Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

## **Referencia bibliográfica**

---

Bravo F. Factores que influyen en la discontinuidad para la toma de Papanicolaou en mujeres atendidas en el Centro de Salud Leonor Saavedra, setiembre-octubre 2017 [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Escuela Profesional de Obstetricia; 2018.

---



Universidad Nacional Mayor de San Marcos  
Universidad del Perú. Decana de América  
Facultad de Medicina



Escuela Profesional de Obstetricia  
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"  
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

71

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TITULO  
PROFESIONAL DE LICENCIADO (A) EN OBSTETRICIA

El jurado designado para evaluar la Sustentación de Tesis, de acuerdo a las "Normas para la Elaboración de Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado (a) en Obstetricia en las Escuelas Profesionales de la Facultad de Medicina", de:

**BACHILLER: BRAVO LURITA FIORELA ESTHER**

Cuyo título es: **FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISCONTINUIDAD PARA LA TOMA DE PAPANICOLAOU EN MUJERES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD LEONOR SAAVEDRA, SETIEMBRE – OCTUBRE 2017.** Reunidos en la fecha, después de la sustentación y resolución de preguntas por el Tesista, acordó el siguiente calificativo:

*Bueno*

*Dieciséis*

*16*

DRA. MILENA LÓPEZ SANCHEZ  
C.O.P.  
PRESIDENTE

MG. MARTA LUQUE SUMA  
C.O.P. 2843  
MIEMBRO

LIC. YOANDA QUISPE ALOSILLA  
C.O.P. 3036  
MIEMBRO

MG. EMMA F. SALAZAR SALVATIERRA  
C.O.P. 0730  
ASESOR (A)

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
FACULTAD DE MEDICINA  
  
Mg. CLARA DIAZ TINOCO  
DIRECTORA

Lima, 03 de mayo del 2018

## **Resumen**

**Objetivo:** Identificar los factores que influyen en la discontinuidad para la toma de Papanicolaou en mujeres atendidas en el centro de salud Leonor Saavedra, Septiembre – Octubre 2017

**Material y métodos:** Estudio de tipo prospectivo, transversal, analítico, cuantitativo de casos y controles. Se encuestó a 180 mujeres distribuidas en dos grupos de 90 tanto para casos como para controles, usuarias del servicio de planificación familiar durante los meses de setiembre – octubre del 2017 y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.

**Resultados:** El análisis de la variable en estudio sobre los factores influyentes de la discontinuidad para la toma de Papanicolaou fueron: estado civil soltera (OR: 4.7;  $p < 0.05$ ), nivel socioeconómico bajo (OR: 2.3;  $p < 0.05$ ), presencia de temor (OR: 4.5;  $p < 0.05$ ), vergüenza (OR: 2.8;  $p < 0.05$ ), incomodidad (OR: 3.14;  $p < 0.05$ ), dolor (OR: 3.5;  $p < 0.05$ ), mala relación usuaria – proveedor (chi cuadrado: 14.27;  $p < 0.05$ )

**Conclusión:** El estado civil soltera, el nivel socioeconómico bajo, presencia de temor, vergüenza, incomodidad y dolor son factores influyentes en la discontinuidad para la toma del Papanicolaou, así mismo una mala relación usuaria – proveedor es un factor influyente para la discontinuidad de dicha prueba.

**Palabras claves:** Factor, discontinuidad y Papanicolaou.

## **Summary**

**Objective:** Identify the factors that influence the discontinuity for Papanicolaou taking in women treated at Leonor Saavedra health center September - October 2017.

**Materials and methods:** Prospective, cross-sectional, analytical, quantitative study of cases and controls. We surveyed 180 women distributed in two groups of 90 for both cases and controls, users of the family planning service during the months of September - October 2017 and who met the inclusion and exclusion criteria.

**Results:** The analysis of the variable under study on the influencing factors of the discontinuity for Papanicolaou was: Single marital status (OR: 4.7;  $p < 0.05$ ), low socioeconomic level (OR: 2.3;  $p < 0.05$ ), presence of fear (OR: 4.5;  $p < 0.05$ ), embarrassment (OR: 2.8;  $p < 0.05$ ), discomfort (OR: 3.14;  $p < 0.05$ ), pain (OR: 3.5;  $p < 0.05$ ), bad relationship between user – provider (chi squared: 14.27;  $p < 0.05$ ).

**Conclusions:** The single marital status, low socioeconomic level, presence of fear, embarrassment, discomfort and pain are influential factors in discontinuity for the Papanicolaou test. In addition, a bad relationship between users – provider is an influential factor to discontinue with this test.

**Keywords:** Factor, discontinuity and Papanicolaou.