



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina

Escuela Profesional de Obstetricia

**Función sexual durante el climaterio en las mujeres
atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil
Tahuantinsuyo bajo en el año 2015**

TESIS

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia

AUTOR

Giulianna MAMANI CORDOVA

ASESOR

Lupe Antonieta VARGAS ZAFRA

Lima, Perú

2018

RESUMEN

OBJETIVO: Identificar la función sexual durante el climaterio en las mujeres pre y postmenopáusicas atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil Tahuantinsuyo Bajo en el año 2015

METODOLOGÍA: Estudio de tipo observacional y con diseño analítico - comparativo, de corte transversal. Se evaluaron a 144 mujeres que se encontraban en la etapa del climaterio, las cuales fueron atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil Tahuantinsuyo Bajo, 2015, a las que se les aplicó un cuestionario de "Índice de Función Sexual (IFSF)". Para el análisis de datos, se tuvo en cuenta medidas de tendencia central (media) y medidas de dispersión (desviación estándar). Al análisis inferencial, para las variables cuantitativas, se estimó la t de Student, considerándose significativo un valor $t < 0.05$.

RESULTADOS: El Índice de Función sexual de las mujeres en el grupo de premenopausia fue 25.65 ± 4.23 , mientras que el grupo de postmenopausia tiene un índice de 20.93 ± 3.62 , existiendo diferencia significativa en ambos grupos ($t=0.000$). Analizando por dimensiones, se evidenciaron diferencias significativas para el dominio deseo ($t=0.000$), excitación ($t=0.000$), lubricación ($t=0.000$), orgasmo ($t=0.000$), satisfacción ($t=0.000$), dolor ($t=0.000$) del grupo de pre menopáusicas respecto al grupo de postmenopáusicas, es decir, las mujeres en la etapa pre menopáusica tienen mayor puntaje en los seis dominios que las mujeres postmenopáusicas.

CONCLUSIÓN: La función sexual durante el climaterio fue menor en las mujeres postmenopáusicas que en las pre menopáusicas atendidas en el Centro de Salud Materno Infantil Tahuantinsuyo Bajo en el año 2015.

PALABRAS CLAVES: Función sexual, climaterio, pre menopausia, postmenopáusicas

ABSTRACT

OBJECTIVE: To identify sexual function during the climacteric in pre and postmenopausal women attended at the Maternal and Child Health Center Tahuantinsuyo Bajo in 2015.

METHODOLOGY: Study of observational type and with analytical comparative design, of cross section. We evaluated 144 women who were in the climacteric stage who were treated at the Maternal and Child Health Center Tahuantinsuyo Bajo, 2015, by applying a questionnaire of "Sexual Function Index (IFSFI)". For the analysis of data, measures of central tendency (mean) and measures of dispersion (standard deviation) were taken into account. In the inferential analysis, the Student t was estimated for the quantitative variables, considering a t value <0.05 as significant.

RESULTS: Index sexual function of women in pre-menopausal group was 25.65 ± 4.23 , while the postmenopause group has an index of 20.93 ± 3.62 , there were significant difference in both groups ($t=0.000$). Analyzing by dimensions, significant differences were evidenced for the desire domain ($t=0.000$), excitation ($t=0.000$), lubrication ($t=0.000$), orgasm ($t=0.000$), satisfaction ($t=0.000$), pain ($t=0.000$) of the pre-menopausal group with respect to the postmenopausal group, that is, women in the pre-menopausal stage have higher scores in the six domains than post-menopausal women

CONCLUSIONS: Sexual function during the climacteric was lower in postmenopausal women than in pre-menopausal women attended at the Maternal and Child Health Center Tahuantinsuyo Bajo in 2015.

KEYWORDS: Sexual function, climacteric, premenopausal, postmenopausal