



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina

Escuela Profesional de Enfermería

**Factores asociados a la adherencia al tratamiento en el
paciente con tuberculosis en un establecimiento
de salud, Lima 2017**

TESIS

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería

AUTOR

Geraldine Jemima ARIZA QUISPE

ASESOR

Maria Fabiola QUIROZ VASQUEZ

Lima, Perú

2018

RESUMEN

Objetivo: Determinar los factores asociados a la adherencia al tratamiento en el paciente con tuberculosis en el establecimiento de salud Villa San Luis, SJM 2017.

Material y Método: Estudio de enfoque cuantitativo, nivel aplicativo, tipo descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada por 42 pacientes con tuberculosis que asistieron al Centro de Salud Villa San Luis. La técnica de recolección de datos fue la entrevista y se aplicó mediante un instrumento: un cuestionario elaborado con 41 preguntas dicotómicas para determinar los factores.

Resultados: Se obtuvo que del total de 100% (42) pacientes, el 70% (28) de pacientes tienen factores que no favorecen a la adherencia al tratamiento según dimensión tratamiento farmacológico, a su vez el 57% (23) de pacientes tienen factores que favorecen a la adherencia al tratamiento según dimensión al ambiente, el 54% (22) de pacientes refieren tener factores que favorecen a la adherencia al tratamiento según dimensión personal y el 54% (22) de los pacientes tienen factores que favorecen a la adherencia al tratamiento según dimensión los servicios de salud.

Conclusiones: La mayoría de los pacientes que asisten al centro de salud presentan factores que favorecen la adherencia al tratamiento en las dimensiones ambiente, paciente y servicios de salud. Sin embargo, la mayoría de paciente refieren tener factores que no favorecen a la adherencia en la dimensión tratamiento farmacológico.

Palabras claves: Adherencia Al Tratamiento, Tuberculosis, Factores Asociados.

SUMMARY

Objective: To determine the factors associated with adherence to treatment in patients with tuberculosis at the Villa San Luis health facility, SJM 2017.

Material and method: Study of quantitative approach, application level, descriptive type of cross section. The population consisted of 42 patients with tuberculosis who attended the Villa San Luis Health Center. The data collection technique was the interview and an instrument was used: a questionnaire prepared with 41 dichotomous questions to determine the factors.

Results: It was obtained that of the total of 100% (42) patients, 70% (28) of patients have factors that do not favor adherence to treatment according to the pharmacological treatment dimension, in turn 57% (23) of patients have factors that they favor adherence to treatment according to the environment, 54% (22) of patients refer to factors that favor adherence to treatment according to the personal dimension, and 54% (22) of patients have factors that favor adherence to treatment according to the dimension of health services.

Conclusions: Most patients who attend the health center have factors that favor adherence to treatment in the environment, patient and health services dimensions. However, the majority of patients report having factors that do not favor adherence in the pharmacological treatment dimension.

Key words: Adherence to Treatment, Tuberculosis, Associated Factors.