



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina

Escuela Académica Profesional de Medicina Humana

**Características de las adolescentes que presentan
aborto incompleto y que son sometidas al
procedimiento de aspiración manual endouterina en el
Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Nacional
Daniel Alcides Carrión. Callao - 2013**

TESIS

Para optar el Título Profesional de Médico Cirujano

AUTOR

Alfredo Luis URQUIZA COLOMA

ASESOR

Julio Raymundo AGUILAR FRANCO

Lima, Perú

2014

**CARACTERÍSTICAS DE LAS ADOLESCENTES QUE PRESENTAN
ABORTO INCOMPLETO Y QUE SON SOMETIDAS AL PROCEDIMIENTO DE
ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA (AMEU) EN EL SERVICIO DE
GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES
CARRION. CALLAO - 2013”**

RESUMEN

Objetivo: Determinar las características de las adolescentes que presentan aborto incompleto y son sometidas al procedimiento de aspiración manual endouterina en el Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Callao – 2013.

Materiales y Métodos: Este trabajo fue es un diseño cualitativo, descriptivo y transversal, el cual permitirá determinar las características de las adolescentes que presentan aborto incompleto y son sometidas al procedimiento de aspiración manual endouterina.

Resultados: los antecedentes ginecoobstétricos de la adolescente, como son en que el 62% (31) solo han tenido una sola gestación. En cuanto al número de partos, el 74%(37) no presento ningún parto. En cuanto a las cesáreas el 88%(44) no realizó ninguna. En cuanto a la ocurrencia de abortos en las adolescentes, se tiene que el 38%(19) han tenido un aborto como mínimo. Los resultados obtenidos acerca de las características del AMEU en la adolescente, se tiene que en cuanto al tipo de anestesia el 80%(40) tuvo pseudoanalgesia. El tipo de dolor que se presentó, el 64%(32) presento dolor leve, y el 36%(18) presento dolor moderado. En cuanto a los restos obtenidos, el 60%(30) tuvo restos regulares, y el 34%(17) tuvo restos escasos.

Conclusiones: El único factor sociodemográfico que constituye un riesgo para el aborto espontáneo en las mujeres del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión es edad mayor o igual de 18 años. En cuanto a los síntomas que antecedieron a los abortos, el dolor abdominal fue el presentado mayoritariamente en las adolescentes, y en segundo lugar el sangrado transvaginal. El tipo de dolor que se presento fue el dolor leve. En cuanto a los restos obtenidos en la mayoría de adolescente se obtuvo restos regulares.

Palabras claves: ABORTO, ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA
MORBILIDAD MATERNA

**FEATURES OF INCOMPLETE ABORTION TEEN POSING AND
PROCEDURES ARE SUBJECT TO MANUAL VACUUM ASPIRATION (MVA)
IN OBSTETRICS-GYNECOLOGY SERVICE OF NATIONAL HOSPITAL
DANIEL ALCIDESCARRIÓN. CALLAO - 2013 "**

ABSTRACT

Objective: To determine the characteristics of adolescents with incomplete abortion and are subject to manual vacuum aspiration procedure in the Service of Gynecology and Obstetrics Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Callao - 2013.

Materials and Methods: This study was a qualitative, descriptive and cross-sectional design, which will determine the characteristics of adolescents with incomplete abortion and are subject to manual vacuum aspiration procedure.

Results: Teen reproductive background, as they are in that 62% (31) have had only one pregnancy. As for the number of births, 74% (37) did not present any delivery. As for C-sections 88% (44) did not perform any. Regarding the occurrence of abortions among adolescents, there is that 38% (19) have had an abortion. the results obtained about the characteristics of MVA in the adolescent, must be about the type of anesthesia, 80% (40) had pseudoanalgesia. The type of pain that is present, 64% (32) presented mild pain, and 36% (18) presented moderate pain. As for the rest obtained, 60% (30) had regular remains, and 34% (17) had little rest.

Conclusions: The only sociodemographic factor that constitutes a risk for spontaneous abortion in women of Gynecology and Obstetrics Service of the Hospital Nacional Daniel AlcidesCarrión is greater or equal age of 18-24 years. As for the symptoms that preceded the abortions, abdominal pain was presented mainly in adolescents, and vaginal bleeding as the term.

The kind of pain that was present mild pain.As residues obtained in most regular traces obtained teenager.

Keywords: ABORTION, MANUAL VACUUM ASPIRATION BREAST DISEASE